

varianta šestá

<i>t</i>	<i>b</i>	<i>d</i>	<i>u</i>	<i>s</i>	<i>c</i>
$x^3 \cdot t^{8/3}$	$x^3 \cdot t^{5/3}$	$x^1 \cdot t^{2/3}$	$x^1 \cdot t^{-1/3}$	$x^2 \cdot t^{2/3}$	$x^2 \cdot t^{5/3}$
-----	-----	-----	-----	-----	-----
$x^2 \cdot t^{10/3}$	$x^2 \cdot t^{7/3}$	$x^0 \cdot t^{4/3}$	$x^0 \cdot t^{+1/3}$	$x^1 \cdot t^{4/3}$	$x^1 \cdot t^{7/3}$

náboj : -1/3 +2/3 -1/3 +2/3 -1/3 +2/3

U textu <i>budiž</i> tabulka kvarku.

K této tabulce chci říci, že pro kvarky jsem si navrhl (vynalezl) neceločíselné mocniny u $\Delta t/t$ tak, aby po součinu tří tvarků (pro baryony) byl výsledný „vzoreček“ (pro elementární částice) s celočíselnými mocninami ...,což také musí platit i při použití dvou kvarků (kvark a antikvark) pro mezony. Zde vidíte dál-níže tabulku <i>u textu budiž tabulka mezonů</i> všech kombinací (21 kombinací) dvojic kvark x antikvark pro mezony ...Vždy je výsledný vzoreček s celočíselnými mocninami. Dále je vidět, že tabulka má „vzorečky“ se vzestupnou posloupností.

Vraťme se ke kvarkům : uspořádání čísel mocnin je harmonické do vlnovky – viz obrázek. Osm čísel

-1/3 ; 1/3 ; ; 2/3 ; 4/3 ; ; 5/3 ; 7/3 ; ; 8/3 ; 10/3
 rovněž „nějak“ souvisí s gluony ...to prozatím nevím jak. Navrhl jsem sínusovku (u textu <i>budiž</i> nákras sínusovky) bodů z čísel pro kvarky stočit do spirály a dát na válec coby řez válcem - viz obrázek <i>u textu budiž obrázek válce se spirálou</i> (co ho ještě dodatečně pošlu). Dále je zajímavé, že dvojice (rodinka) kvarků mají stejné mocniny u dimenze délkové a „skoky“ se dějí po „dvojicích kvarků“ kdežto u dimenze časové se to děje také, ale jinak se „sínusovým postupem“ s posunutím třetin. Takže je-li elementární částice stavem vlnobalíčku s n,m-mocninami (n,m-dimenzemi veličiny délka a čas), pak kvarky jsou již „stočeny“ do válce, kvarky jsou hmotové útvary jako jakési aproximace (už nerozmazané), ale hodnotou aproximované „do třetin“ ...jakoby se už dimenze kompaktovaly ... gluony pak reprezentují ty mocniny. To vše je výklad nevědecký a pouze vizuálně-pocitový.

Nyní pro <i>takto</i> postavené vzorce pro kvarky sestavím z nich tabulku mezonů :

U mezonů si pak všimněte, že mocniny u x-dimenze je „v rovině“ a pak se přehoupne výš skokem, u t-dimenze má šikmý vzestup a pak sestup a zase šikmý vzestup – lépe to pak vidět na grafu s použitím čísel mocnin do grafu.

U textu <i>budiž</i> tabulka mezonů

Mezon's – table : 21 particle

(quark x		name particle
x antiquark)		

volbu označení-pojmenování mezonů přizpůsobuji ZOEmu

VI)


$$(U U^-) \begin{array}{c} x^1 \cdot t^{-1/3} \\ \text{-----} \\ x^0 \cdot t^{+1/3} \end{array} \cdot \begin{array}{c} x^0 \cdot t^{+1/3} \\ \text{-----} \\ x^1 \cdot t^{-1/3} \end{array} = \begin{array}{c} x^1 \cdot t^0 \\ \text{-----} \\ x^1 \cdot t^0 \end{array} * \rho^0 = \pi_u^0 \quad (uu^- - dd^-) / \sqrt{2} \Rightarrow \pi^0$$

(U ⁻ D)	$\frac{x^0 \cdot t^{+1/3}}{x^1 \cdot t^{-1/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^1 \cdot t^1}{x^1 \cdot t^1}$	* $\rho^{+-} = \pi_d^{+-}$
(D D ⁻)	$\frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	$\cdot \frac{x^0 \cdot t^{4/3}}{x^1 \cdot t^{2/3}}$	=	$\frac{x^1 \cdot t^2}{x^1 \cdot t^2}$	* $\omega^0 = \eta_d^0 (uu^- + dd^- - 2ss^-)/\sqrt{6} \Rightarrow \eta^0$
-----					-----
(S ⁻ U)	$\frac{x^1 \cdot t^{4/3}}{x^2 \cdot t^{2/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}}$	=	$\frac{x^2 \cdot t^1}{x^2 \cdot t^1}$	* $K^{+-} = K_u^{+-}$
(U C ⁻)	$\frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}}$	=	$\frac{x^2 \cdot t^2}{x^2 \cdot t^2}$	* $D^0 = D_u^0$
(S ⁻ D)	$\frac{x^1 \cdot t^{4/3}}{x^2 \cdot t^{2/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^2 \cdot t^2}{x^2 \cdot t^2}$	* $K^0 = K_d^0$
(D C ⁻)	$\frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}}$	=	$\frac{x^2 \cdot t^3}{x^2 \cdot t^3}$	* $D^{+-} = D_d^{+-}$
-----					-----
(S ⁻ S)	$\frac{x^1 \cdot t^{4/3}}{x^2 \cdot t^{2/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^2}{x^3 \cdot t^2}$	* $\phi^0 = \eta_s^0$
(U T ⁻)	$\frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3}$	* $T^0 = T_u^0$
(B ⁻ U)	$\frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{-1/3}}{x^0 \cdot t^{+1/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3}$	* $B^{+-} = B_u^{+-}$
(C ⁻ S)	$\frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3}$	* $D_s^{+-} = D_s^{+-} = \text{axis} = \text{axis}$
(D T ⁻)	$\frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^3}{x^3 \cdot t^3}$	* $T^{+-} = T_d^{+-}$

(B ⁻ D)	$\frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{2/3}}{x^0 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^4}{x^3 \cdot t^4}$	*B⁰ = B_d⁰
(C C ⁻)	$\frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}}$	$\cdot \frac{x^1 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}}$	=	$\frac{x^3 \cdot t^4}{x^3 \cdot t^4}$	*J/Ψ⁰ = η_c⁰

(T ⁻ S)	$\frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}}$	=	$\frac{x^4 \cdot t^3}{x^4 \cdot t^3}$	*T_s^{+·} = T_s^{+·}
(S B ⁻)	$\frac{x^2 \cdot t^{2/3}}{x^1 \cdot t^{4/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}}$	=	$\frac{x^4 \cdot t^4}{x^4 \cdot t^4}$	*B_s⁰ = B_s⁰
(T ⁻ C)	$\frac{x^2 \cdot t^{7/3}}{x^3 \cdot t^{5/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}}$	=	$\frac{x^4 \cdot t^4}{x^4 \cdot t^4}$	*T_c⁰ = T_c⁰
(C B ⁻)	$\frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^1 \cdot t^{7/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{10/3}}{x^3 \cdot t^{8/3}}$	=	$\frac{x^4 \cdot t^5}{x^4 \cdot t^5}$	*B_c^{+·} = B_c^{+·}

(B ⁻ B)	$\frac{x^3 \cdot t^{7/3}}{x^2 \cdot t^{5/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^3 \cdot t^{7/3}}$	=	$\frac{x^5 \cdot t^4}{x^5 \cdot t^4}$	*Y_b⁰ = Y_b⁰
některá liter. říká U ⁰					
(B T ⁻)	$\frac{x^2 \cdot t^{5/3}}{x^3 \cdot t^{7/3}}$	$\cdot \frac{x^3 \cdot t^{10/3}}{x^2 \cdot t^{8/3}}$	=	$\frac{x^5 \cdot t^5}{x^5 \cdot t^5}$	*B_b^{+·} = B_b^{+·} přejmenováno
(T ⁻ T)	$\frac{x^3 \cdot t^{10/3}}{x^2 \cdot t^{8/3}}$	$\cdot \frac{x^2 \cdot t^{8/3}}{x^3 \cdot t^{10/3}}$	=	$\frac{x^5 \cdot t^6}{x^5 \cdot t^6}$	*Φ_t⁰ = Φ_t⁰
□□pozměnil jsem ZOEho označení Z ⁰ na φ ⁰					



d	u	s	c	t	b
$x^1 \cdot i^{2/3}$	$x^1 \cdot i^{1/3}$	$x^2 \cdot i^{2/3}$	$x^2 \cdot i^{5/3}$	$x^3 \cdot i^{8/3}$	$x^3 \cdot i^{5/3}$
$x^0 \cdot i^{4/3}$	$x^0 \cdot i^{+1/3}$	$x^1 \cdot i^{4/3}$	$x^1 \cdot i^{7/3}$	$x^2 \cdot i^{10/3}$	$x^2 \cdot i^{7/3}$
BA	BB	BA	BB	BA	BB - chut'

„Korálky“ kvarků se mohou >spřaženě< pohybovat po „sinusové niti“ a „nic se neděje“ – změna by se týkala pouze „přejmenovávání objektů“. Zřejmě budou kvarky v hadronech pouze aproximace „nepravidelných zhištění a zředění“ čili „chvění“ veličin tj. chvění – vlnění délky a času „převedené do sinusovek“ tedy chvění časoprostorové pěny na miniúrovnicích coby přeměna velkorozměrové plochosti vesmíru do kompakťifikovaných křivostí v mikrosvětě, až natolik prováděného zakřívování, že toto se děje do vlnobalíčků z veličin délka a čas a tyto kompakťifikované multidimenziovální „propleteniny vlastních dimenzí“ jsou hmotové artefakty. Sinusovka je ve válci „klesající přímkou“. Čili >linea< makrosvěta se „zakříví“, zakříví-li se i souřadnice souřadné soustavy, tedy obráceně : Bude-li pozorovatel v zakřivených souřadnicích (od globální gravitace), (např. ve válci, kuželu či paraboloidu...) pak se zakříví i „původní“ lineá.

Špejlovou pyramidu jsem si doma postavil z tohoto grafu s úhly $60^\circ - 60^\circ - 60^\circ$, tedy i mezi osami x a t

Tab. 9 - mezonů je z "Úvod do unitární teorie Universa" pana D.J.Zoevistiana - originál

	\bar{d}	\bar{u}	\bar{s}	\bar{c}	\bar{b}	\bar{t}
d	η^0	π^-	K^0	D^-	B^0	T^-
u	π^+	π^0	K^+	D^0	B^+	T^0
s	\bar{K}^0	K^-	η_s^0	D_s^-	B_s^0	T_s^-
c	D^+	D^0	D_s^+	η_c^0	B_c^+	T_c^0
b	\bar{B}^0	B^-	B_s^0	B_c^-	Y^0	T_b^-
t	T^+	T^0	T_s^+	T_c^0	T_b^+	Z^0

Tab. 9a - tabulka mezonů „Zoevistian“ tatáž, pouze >melodicky< upravená do sínusovky

Můj Graf výše „síťový“ předchozí koresponduje naprosto spolehlivě s touto tabulkou ; >vzestupy< a >sestupy< jsou, jdou „do elipsy“ a jsou patrné z grafu. Podrobný komentář jinde.

	d ⁻	u ⁻	s ⁻	c ⁻	t ⁻	b ⁻	
d	η_d^0	π_d^{+-}	K_d^0	D_d^{+-}	T_d^0	B_d^{+-}	2/3
u		π_u^0	K_u^+	D_u^0	T_u^{+-}	B_u^0	- 1/3 --> „ $\pi(u)(o)$ důlek“
s			η_s^0	D_s^{+-}	T_s^0	B_s^{+-}	2/3
c				η_c^0	T_c^{+-}	B_c^0	5/7
t					Φ_t^0	B_t^{+-}	8/10 --> „ $\Phi(t)(o)$ vrchol“
b						Y_b^0	5/7
		↓			↓		
		důlek			vrchol		

Z^0 u Zoevistiana je totožno Φ_t^0 u mě

