

Pane Zephir, dívám se, že ještě v noci o půl čtvrté mi píšete, že chcete mé výpočty a důkazy ... a přitom ty výpočty jsem Vám na mě přidělenou adresu už pár minut před půlnocí poslal ...??

Zadruhé se stále pídíte po logice té gr.konstanty...? Ale už i tady na Mageo jsem o té logice psal několikrát - pouze to neposloucháte anebo spíše nevnímáte. Proč ? Řeknu to znova jako žákům v 5A ZŠ :

Nejelegantnější rovnice paraboly je $A \cdot A = B + B \dots$ a z ní to vzešlo (!), protože $1 = (2/B) \cdot (B^2/A^2)$ a pak už útvar $(2/B)$ je ta G-konstanta a (B^2/A^2) je lineární zbytek. Tím pádem jeho dimenze mohu multiplikovat

$(B^2/A^2)^n$ a tento výraz už je shodný s $(m/v^2 \cdot x)$, což lze snadno dokázat ... a pak lze za "m" dosadit univerzální stav dimenzí pro gravitaci.

Nelineární rovnici paraboly $A \cdot A = B+B$, čili $(B^2/A^2) = 1$, čili "Parabola = 1", pak lze postavit lineárně tak, že "parabola = parabola", čili $(B^2/A^2) = (B^2/A^2)^n$ a v tomto provedení už slouží k interakcím pro svět kvantové mechaniky ... z ní postavím každou poznanou interakci jaderné fyziky...na mých stránkách je z ní i celý demonstrován CNO cyklus běžící na Slunci.

Toť ten princip princip gravitace $A \cdot A = B + B$, který bude zřejmě i prvním pravidlem v posloupnosti zákonů v tomto vesmíru po Třesku. (... a bude-li opravdu dokázán, bude to ta rovnice, co jí budou lidé nosit vytištěnou na tom tričku ... jak říkal jeden fyzik)

JN 06.07.2005

PEPEEEK [6.7.05 - 08:34]

...pozor udělal jsem překlep (přemýšlel jsem zda ten překlep mám nechat a zda vůbec na něho někdo přijde čím se dobře kontroluje čtenářská obec ...na svých www-stránkách v jednom dokumentu nechávám překlep už 5 let úmyslně - triviální chybu a dodnes mě na ní nikdo neupozornil!), ale tady se chce diskutovat nikoliv počítat, tak **překlep ukáží** : ve větě *Nelineární rovnici paraboly $A \cdot A = B+B$, čili $(B^2/A^2) = 1$, čili "Parabola = 1"*... **má být**: Nelineární rovnici paraboly $A \cdot A = B+B$, čili $(A^2/2B) = 1$, čili "Parabola = 1"...

Ano, pane Jamesson, všiml jste si toho dobře (!) (konečně to lidi čtou). S řádovou chybou jsem se také před 21 lety dost dlouho potýkal cca 2 roky. Popis toho na co jsem přišel je na mých www-stránkách např. G 13 . Ha, teď jsem se sám šel podívat na internet a G 13 tam není. můj webmaster bude zpacován, že je lajďák. Pokusím se aby do večera tam G 13 byla. Zjistil jsem, že řádové chyby se nalézají v jiných astrofyzikálních poznatcích a já je už před 20 ti lety zkoumal a porovnával. Dospěl jsem ke (prozatím spekulativnímu) poznatku, že oněch 5 ukázek, kde se nachází řádová chyba je z důvodů "volby jednotek" a z důvodů " posunu řezu na světelném kuželi" vůči určitým symetriím, např. jedna je: stáří vesmíru a čas který potřebuje světlo k průletu atomem, jsou od sebe řádově 10^{42} a my se nacházíme téměř uprostřed ale bokem o ony dva řády. další 4 podobné příklady jsou rozebrány na mých www-stránkách které už 5 let nikdo nečte, ale už spousty rádoby mudrců (tedy těch věštců z koule co to nečetli, ale ví o mých prasečínách vše) se vyslovilo o mé stoprocentní demenci. I já hledal tu záhadu řádových posunů, no, na něco jsem přišel, ale není to ještě asi dobře, chce to další mozky... i tady se možná ukáže nový poznatek ... která právě možná signalizuje ten problém chybějící hmoty ve vesmíru - řádově o dva řády (!) a možná to není pravda, nechybí tam ani deko, možná observační poznatky dosazují fyzikové do rovnic takových, které vykazují "jakousi" chybu a tím se "myslí" že vesmíru hmota chybí ...Prozatím to i já pokládám za své spekulace a ... a škoda, že nemám kamarády, co by nastudovali mých 5 stran "spekulací" nad řádovými chybami, možná by sami na něco přišli. Nic není ztraceno, jednou to někdo nastudovat musí...a nastuduje a pomůže to dopracovat.

Pane Zephir, s tou „G“ konstantou je to horší (v můj neprospěch) víc než si myslíte a než víte. Já totiž uvádím ve své práci (čehož jste si možná nevšiml) ty „G konstanty“ dvě bohužel. (!) Takto :

$$*G = 2 \cdot t_c / c \cdot t_v = c / t_w \cdot t_v = G^*$$

 (pozn. : t_c ; t_v ; t_w jsou téééčka indexovaná tím druhým písmenkem) a t_c ; t_v značí (vysvětlení opomenu, je jinde), ale má hodnotu $t_c \cdot 10^{-1} \dots$ a t_v má hodnotu 10^{+1}

 t_w – stáří vesmíru. Takže vidíte, že jedno G je konstanta v čase a druhé G se mění v čase. To je průser, že ? Vysvětlení je takové, že první *G patří do gravitace ve „stopčase“, kde se nemění ani číselné množství hmotnosti vesmíru. Druhé G* je proměnná veličina – nekonstanta, pro takový vesmír, kde i množství hmoty se ve vesmíru s časem mění. Samozřejmě, že i já s touto úvahou jsem v plenkách a nesmíte být na mě kat a chtít hned DDD (Důkaz Důkazovič Důkazenko).

=====

GRAVITACE

$$A \cdot A = B + B$$

$$A^2 = 2B \quad (\text{parabolic})$$

$$1 = 2/A \cdot B/A \dots\dots\dots 1 = 2/A \cdot B_i^n/A_j^n$$

$$1 = (2t_c/c \cdot t_v) \cdot (c^2 \cdot v \cdot t_c) \cdot (1/c^2 \cdot x_v) \cdot t_v/t_c \quad (\text{grav. red shift})$$

$$1 = G_a \cdot m \cdot 1/c \cdot x \cdot \Delta t/t$$

$$1 = G_a \cdot (x_i^n \cdot t_j^n / x_k^m \cdot t_l^m)$$

$$1 = G_a \cdot \text{„linearity“} = \text{„quadrat“}$$

$$1 = (2/c) \cdot (v/c) \dots \text{parabolic} \equiv \text{macrocosmos}$$

→ to vše při založené konvenci :

$$\begin{array}{ccccccc}
 c^* > c > w = w > u \\
 \\
 \frac{x_c}{t_c} > \frac{x_v}{t_c} < \frac{x_c}{t_w} > \frac{x_v}{t_w} \\
 \\
 \frac{\sqrt{2} \cdot x_v}{t_v} = \frac{x_c}{t_c} = \frac{\sqrt{2} k x_v}{t_c} = \frac{\sqrt{2} k x_c}{t_w} = \frac{2 k^2 x_v}{t_w} = m \cdot x_v / m_0 \cdot t_c
 \end{array}$$

$$1 = (\text{symbolicky}) = \infty \cdot 0 / 1 \cdot 1$$

$$(Z) \quad \sqrt{2} \cdot v = c = \sqrt{2} k w = \sqrt{2} k w = 2 k^2 u = \sqrt{2} k \cdot \sqrt{2} k u = 1$$

$$c / \sqrt{2} k = w = \sqrt{2} k u$$

x_{HV} - vzdálenost na hranice vesmíru, proto „H V „
 $c = \text{----}$
 t_w - věk vesmíru, proto „V V „ $t_w = 1 / H$ (Hubbleova konstanta)

A tak se vracím k MAGEu a k citaci JAMESSON kontra PEPEEEK :“ (Navrátil) Pokud je rovnice nelineární, proč by měla platit rovnost rozměrová ? ? ? ? Přemýšlejte, prosím.
 (Jamensson) Slovo rovnice je etymologicky vytvořeno z pojmu "rovnati se", sémanticky pak z významu "je totožné/shodné". Proč ? Myslím, že jsem dostatečně vysvětlil co je mým úmyslem a ... a matematikové ať si to do správné matematiky přepíší.
 Dál nebudu vyhledávat vaše „tři výtky“ a mé „tři vadné odpovědi“ ... neb myslím, že jsem podstatu už zde přednesl – a pokud podstatu úmyslu pochopíte, pak si jako vědec už domyslíte úpravu do matematiky.

=...žádné mechanické vysvětlení podstaty gravitace se nepodařilo podat. Otázka „proč tělesa kolem sebe budí gravitační pole?“ může být v přístupu unitární teorie dokonce úplně postavena na hlavu : pole se považuje za primární a otázka zní : “Jak je hmota z pole vytvořena?”

A nyní postavím nelineární rovniciNejjednodušší je parabola ve tvaru $A^2 = k \cdot B$
 čili volím :

$$1 = \frac{2 \cdot B^2}{B \cdot A^2} = \frac{2}{B} \cdot \frac{B^2 \cdot A_i^n \cdot B_i^n}{A^2 \cdot A_i^n \cdot B_i^n} \dots\dots\dots (c)$$

konvence

$$\sqrt{2} \cdot v = c = \sqrt{2} k w = \sqrt{2} k w = 2 k^2 u$$

$$\frac{\sqrt{2} \cdot x_v}{t_v} = \frac{x_{HV}}{t_w} = \frac{\sqrt{2} k x_v}{t_c} = \frac{\sqrt{2} k x_c}{t_w} = \frac{2 k^2 x_v}{t_w} = m \cdot x_v / m_0 \cdot t_c$$

PROSIM, DIVEJTE SE STÁLE NA TY DVA OBRAZKY PŘI ČTENÍ TOHO CO BUDU PSAT
 Je-li stav vesmíru před Třeskem $c^3 = c^3 = x^3/t^3 = x^3/t^3 = x_c^3/t_c^3 = x_c^3/t_c^3$ tj. (c . c . c = c . c . c)
 coby vyjádření stavu „inertního“...

a je-li vyjádření stavu vesmíru po Třesku do stavu zvlněného např. takto : (c . v . u = w . c . w)
 ... pak pro takovou potřebu změn jednotek dimenzí a jejich poměrů (to jsou rychlosti) bude volena **konvence**, stanovena takto :

$$\sqrt{2} \cdot v = c = c = \sqrt{2} k w = \sqrt{2} k w = 2 k^2 u$$

$$\frac{\sqrt{2} \cdot x_v}{t_v} = \frac{x_{HV}}{t_w} = \frac{x_c}{t_c} = \frac{\sqrt{2} k x_v}{t_c} = \frac{\sqrt{2} k x_c}{t_w} = \frac{2 k^2 x_v}{t_w} = (m \cdot x_v) / (m_0 \cdot t_c)$$

což bude výhodné při použití pro rychlosti v intervalu $0 < u < w < v < c = 1^*$, kde

$$c = R_v \cdot H = x_{HV} / t_w = x_c / t_c$$

$$x_{HV} = 1,3471999 \cdot 10^{26} \text{ m} = R_v - \text{vzdálenost na hranice viditelného vesmíru}$$

$$t_w = 1/H = 4,4937756 \cdot 10^{17} \text{ sec.} = 14,24 \text{ miliard let} - \text{stáří věk vesmíru}$$

Pak se domnívejme, že ve Třesku nastal první „přesmyk-přeskok-zvlnění“, asi něco jako

$$(c \cdot c \cdot x_v = \alpha \cdot c \cdot c \cdot t_c) \dots, \text{ kde si všimnete, že na levé straně je veličinově } (x^3/t^2) \dots / 01^* / \text{ a na pravé straně je veličinově } (x^3 \cdot t^1/t^3) \dots / 02^* / ;$$

$$\text{Linearitu lze např. vyjádřit poměry dimenzí } 1 = \frac{w \cdot c \cdot w}{v \cdot c \cdot u}$$

přesněji už podle konvence jako :

$$1 = \frac{(\sqrt{2} \text{ k w}) \cdot c \cdot (\sqrt{2} \text{ k w})}{(\sqrt{2} \cdot v) \cdot c \cdot (2 \text{ k}^2 \text{ u})} \dots / 03^* /$$

$$/ 04^* / = / 03^* / \cdot „G“$$

$$1 = \frac{(\sqrt{2} \text{ k w}) \cdot c \cdot (\sqrt{2} \text{ k w})}{(\sqrt{2} \cdot v) \cdot c \cdot (2 \text{ k}^2 \text{ u})} \cdot „G“ \dots / 04^* /$$

Děle : Pro OTR si všimnete, že v rovnici $\Sigma F(a) = \Sigma F(g) \dots$, která se napíše VELIČINOVĚ takto : $c^2 \cdot x = G \cdot M \dots / 05^* /$, že se tato rovnice bude přibližovat rovnici / 04^* /, pokud za to „M“ chci podle předem zadaného-zvoleného zadání-přání najít substituční vyjádření v základních veličinách a jejich dimenzích, tedy M také pomocí „x“ a „t“ ... G pak může být číslo, kterému bude

a) přiřazen rozměr (pro zachování rozměrové analýzy) $G = c^2 \cdot x / M \dots \rightarrow$

$$(\text{číslo}) (\text{přiřazený rozměr}) = (\text{metr})^3 / [(\text{sec.})^2 \cdot (\text{kg})^1] \dots \text{čili :}$$

$$\text{číslo } (\text{metr})^3 / [(\text{sec.})^2 \cdot (\text{kg})^1] = (\text{metr})^3 / [(\text{sec.})^2 \cdot (\text{kg})^1] \dots \text{anebo}$$

b) „G“ je něco jiného (než G gravitační konstanta se „zděděným rozměrem“) a má u svého (!) rozměru pouze shodné číslo s grav. konstantou (Rozměr „G“ mající svůj „vzoreček“ z dimenzí „x“ a „t“ je v tabulce dvouveličinových vzorečků pro elementární částice přiřazen gravitonu), a tak nakonec vyjde sestavení rovnice $c^2 \cdot x = G \cdot M \dots / 05^* /$ podle paraboly, vzoru

$$A^2 = 2B \text{ jako } / 01^* / = „G“ \cdot / 02^* / \dots ;$$

Výklad lze říci obráceně : vezmu-li rovnici / 04^* / je lineární bude-li G bezrozměrné číslo ; bude-li G mít svůj rozměr „G“ = 2/c je / 04^* / rovnicí paraboly a návrhy na uspořádání paraboly podle konvence vedou ke tvaru : a) nebo b) nebo c) :

$$a) 1 = \frac{2 \cdot c}{v^2} = \frac{2}{c} \cdot \frac{c \cdot c \cdot v}{v \cdot v \cdot v} = \frac{2 \cdot t_v}{c \cdot t_c} \cdot \frac{(c \cdot c \cdot v \cdot t_c)}{v \cdot v \cdot x_v} = *G \cdot \frac{m}{v^2 \cdot x_v} = G \cdot \frac{m}{v^2 \cdot x_c} \cdot \frac{x_{HV}}{x_c} = G \cdot \frac{m_0}{v^2 \cdot x_v} \cdot \frac{x_{HV}}{x_c}$$

$$b) 1 = \frac{2 \cdot c}{w^2} = \frac{2}{c} \cdot \frac{c \cdot c \cdot v}{w \cdot w \cdot v} = \frac{2 \cdot t_v}{c \cdot t_c} \cdot \frac{(c \cdot c \cdot v \cdot t_c)}{w \cdot w \cdot x_v} = *G \cdot \frac{m}{w^2 \cdot x_v}$$

$$c) 1 = \frac{2 \cdot c}{u^2} = \frac{2}{c} \cdot \frac{c \cdot c \cdot v}{u \cdot u \cdot v} = \frac{2 \cdot t_v}{c \cdot t_c} \cdot \frac{(c \cdot c \cdot v \cdot t_c)}{u \cdot u \cdot x_v} = *G \cdot \frac{m}{u^2 \cdot x_v}$$

konvenci lze ještě rozepsat na tabulku :

$$c \cdot c \cdot c = c \cdot c \cdot c$$

$$c \cdot c \cdot c = \alpha \cdot v \cdot c \cdot c$$

$$\sqrt{2} \cdot k \cdot w \cdot 2 \cdot k^2 \cdot u \cdot c = \sqrt{2} \cdot v \cdot c \cdot c$$

$$1 = \frac{\sqrt{2} \cdot v \cdot c \cdot c}{\sqrt{2} \cdot k \cdot w \cdot 2 \cdot k^2 \cdot u \cdot c}$$

$$1 = G \cdot \frac{\sqrt{2} \cdot v \cdot c \cdot c}{\sqrt{2} \cdot k \cdot w \cdot 2 \cdot k^2 \cdot u \cdot c}$$

← Pocud je to stále rovnice lineární za předpokladu, že za „G“ dodáme bezrozměrné číslo.

Nyní úvaha, že dodáme za G rozměr (tedy nezávisle proměnnou veličinu) a to takový rozměr, aby rovnice byla nelineární parabola :

$$1 = "G" \cdot \frac{c^3}{c^3} = \left(\frac{2 \cdot c}{w^2} \right) \cdot \frac{c^3}{c^3}$$

$$1 = G^* \cdot \frac{c^2 \cdot u}{w^2 \cdot u} = \left(\frac{2}{c} \right)^* \cdot \frac{c^2 \cdot u}{w^2 \cdot u} = \left(\frac{2 \cdot t_c}{c \cdot t_v} \right) \cdot \frac{(c^2 \cdot u \cdot t_c)}{w^2 \cdot x_v} \cdot \frac{t_w \cdot t_v}{t_c^2}$$

z konvence pak plyne $\sqrt{2} \cdot t_c^2 = t_w \cdot t_v$ a po dosazení je

$$1 = G^* \cdot \frac{c^2 \cdot u}{w^2 \cdot u} = \left(\frac{2}{c} \right)^* \cdot \frac{c^2 \cdot u}{w^2 \cdot u} = \left(\frac{2 \cdot t_c}{c \cdot t_v} \right) \cdot \frac{(c^2 \cdot u \cdot t_c)}{w^2 \cdot x_v} \cdot \sqrt{2} \rightarrow \text{Newton}$$

$$1 = \begin{matrix} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ (G) & \cdot (M/w^2 \cdot x) & \cdot c/k \cdot w \\ 1 = & \text{(nelineární čl.)} & \cdot \text{(lineární čl.)} \end{matrix}$$

$$u = \frac{x_v}{t_c}$$

$$2 \frac{(d^2R / d t^2)}{R} + \frac{(d R / d t)^2}{R^2} + \frac{\alpha \cdot c^2}{R^2} = \frac{8 \pi \cdot G \cdot p}{c^2} \rightarrow \text{druhá pohybová rovnice}$$

$$\frac{2 \cdot w^2 \cdot k^2}{R^2} + \frac{c^2}{R^2} + \frac{\alpha \cdot w^2}{R^2} = \frac{4 \cdot w}{R^2} = \frac{2 \cdot G \cdot p}{c^2} \cdot \frac{t_w}{t_c}$$

$$\frac{c^2}{x_{HV}^2} + \frac{c^2}{x_{HV}^2} + (\alpha = 0) = \frac{4 \cdot w}{x_{HV}^2} = \frac{2 \cdot G \cdot m_1 \cdot c \cdot t_w}{c^2 \cdot x_{HV}^2 \cdot t_c \cdot t_c}$$

$$2 \cdot \frac{c^2}{x_{HV}^2} + 0 = \frac{4 \cdot w}{x_{HV}^2} = \frac{2 \cdot G \cdot m_1 \cdot c}{c \cdot w \cdot x_{HV}^2 \cdot t_c} = \frac{2 \cdot G \cdot m_1 \cdot w}{w^2 \cdot x_{HV}^2 \cdot t_c}$$

$$c^2 = 2 \cdot w = \frac{G \cdot m_1}{w \cdot t_c} = \frac{G \cdot m_1}{x_v}$$

↓

$$1 = \frac{G \cdot m_1}{c^2 \cdot x_v} = \frac{2}{c} \cdot \frac{c^2 \cdot u \cdot t_c}{c^2 \cdot x_v} = \frac{2 \cdot t_c \cdot x_c}{c \cdot t_w \cdot x_c} = \frac{2 \cdot w}{c^2} \rightarrow (\text{parabola})$$